



Программа дойного стада

Белково-витаминно-минеральные концентраты
для дойного стада: выращивание, лактация, сухостой





Прибавка надоя
от аминокислотного комплекса

10–15 %

Без ухудшения качества молока — за счёт того, что весь поступающий с кормом сырой протеин участвует в синтезе белка.

Четыре этапа одной коровы

Продуктивность коровы закладывается не в первую лактацию, а в первые месяцы жизни. **Нетели и коровы с хорошим рубцом используют питательные вещества корма более эффективно, что ведёт к получению от них больших надоев молока.** Полноценное и сбалансированное кормление молодняка является основой успешного выращивания ремонтных тёлочек.

Дальше корова живёт в двух чередующихся режимах. В лактацию рацион работает на продуктивность. В сухостой — на то, чтобы следующая лактация вообще состоялась: **основной задачей в кормлении сухостойных коров является недопущение критических сбоев в организме при отёле и переходе к периоду лактации.**

Каждому из четырёх этапов соответствует своя рецептура. Совпадает база — минеральный комплекс, адсорбенты, ферментно-пробиотическая часть; различаются белковая плотность, витамины и вся балансировка.



Линейка БВМКК

ФАСОВКА 25 КГ · МАРКИРОВКА
ПО ЭТАПУ И ИСПОЛНЕНИЮ

ЭТАП 1

Телёнок

БВМКК-1-к · 10–75 дней

ЭТАП 2

Доразщивание

БВМКК-2-к · 76–115 дней

ЭТАП 3

Лактация

БВМКК-61-1С-к · около 305 дней

ЭТАП 4

Сухостой

БВМКК-61-1С-к · около 60 дней

Два исполнения под сырьевую базу хозяйства

Если белковое сырьё у вас своё

Концентрат вводится на 5 % и работает как минерально-витаминная, аминокислотная и ферментная часть рациона. Шрот подсолнечный или жмых рапсовый вы ставите сами — 15 % на доразщивании, 20 % в лактацию и 10 % в сухостой.

Если белок закрываем мы

Исполнение с вводом 20 % уже содержит белковую часть. В хозяйстве остаётся только зерновая группа — 80 % рациона, отдельная закупка шрота не требуется.

БВМКК-1-к гранулированный

телята 10–75 дней · ввод 40 %

В первые месяцы жизни телята интенсивно развиваются: происходит становление рубцового пищеварения и формирование иммунной системы. С усилением процессов брожения в рубце ускоряется **рост ворсинок слизистой оболочки**. По мере развития рубцового пищеварения они быстро растут и к взрослому состоянию достигают высоты 1 см, что во много раз увеличивает их поверхность, через которую всасываются питательные вещества. Наиболее активно рост ворсинок происходит в момент перехода на растительные корма. Но если в этот момент у телёнка недоразвит рубец, животное будет отставать в развитии и не достигнет высокой продуктивности. Эффективнее скармливать зерно в смеси с **гранулами нашего БВМКК-1** — так называемые **мюсли**.

Баланс кальций / фосфор

Находится в таком правильном соотношении для этого периода, что обеспечивает хорошее развитие скелета и укрепление костной ткани, развитие мышечной ткани.

Витаминно-минеральный комплекс

Отлично сбалансирован по необходимым витаминам и микроэлементам, что усиливает иммунную систему организма и сопротивляемость телят заболеваниям.

Повышенное содержание витамина А

Эффективно как профилактическое средство от диареи, «кашля» у телят.

Молочный белок (СОМ)

Увеличивает биологическую ценность протеина, так как недостаточно развит рубец, а также является залогом высокой продуктивности особенно для будущего дойного стада.

Льняной жмых

Повышает питательность протеина, является дополнительным источником витаминов группы В и вит. Е, а остатки льняного масла благоприятно влияют на пищеварение и перистальтику кишечника.

Сливочно-ванильный ароматизатор

Придаёт гранулам приятный сливочно-молочный аромат, что способствует их лучшему поеданию.

Нормы ввода

БВМКК-1-к, гранулы	40 %
Овёс, цельное зерно	30 %
Кукуруза, цельное зерно	30 %
Прирост	850–1100 г/сут

Состав

Шрот соевый · шрот подсолнечный · **жмых льняной** · **сухое обезжиренное молоко** · монокальцийфосфат кормовой · мел кормовой · соль пищевая · масло растительное · дополнительный минеральный комплекс · ароматизатор · Энрастим · **витамин А** · витаминно-минеральный концентрат ПКР-1 (0,1 %)

Показатели качества · на 1 кг концентрата

	СЫРОЙ ПРОТЕИН, %	СЫРОЙ ЖИР, %	КЛЕТЧАТКА, %	КАЛЬЦИЙ, %	ФОСФОР, %	СОЛЬ, %	К. ЕД. / 100 КГ	ОЭ, МДЖ/КГ
БВМКК-1-к	37,35	3,34	10,81	2,10	1,17	2,06	95	10,8

ЭТАП 1

Телёнок

БВМКК-1-к · 10–75 дней

ЭТОТ ПРОДУКТ

ЭТАП 2

Доращивание

БВМКК-2-к · 76–115 дней

ЭТАП 3

Лактация

БВМКК-61-1С-к · около 305 дней

ЭТАП 4

Сухостой

БВМКК-61-1С-к · около 60 дней

БВМКК-2-к

телята 76–115 дней

В состав помимо всех необходимых для роста и развития телёнка витаминов, микроэлементов и минеральных веществ, а также оптимального соотношения кальция / фосфор, входят **живые ферментно-пробиотические культуры**, которые заселяют рубец полезной микрофлорой, при этом повышая её активность, нормализуют процессы пищеварения в рубце, стимулируют развитие преджелудков, улучшают перевариваемость и усвоение питательных веществ корма, предотвращают развитие дисбактериоза и дисперсии, обеспечивают профилактику дисфункции ЖКТ телят, позволяют более эффективно использовать клетчатку корма.

Живые ферментно-пробиотические культуры

Заселяют рубец полезной микрофлорой, нормализуют процессы пищеварения, стимулируют развитие преджелудков и позволяют более эффективно использовать клетчатку корма. Прирост выходит на уровень **1200–1400 г/сут.**

Дополнительный минеральный комплекс

Укрепляет иммунитет животных, что ведёт к увеличению сохранности поголовья, положительно влияет на поедаемость кормов, что соответственно увеличивает среднюю живую массу животных. Телята очень легко переходят на менее затратные (дешёвые) корма.

Комплекс адсорбентов микотоксинов

Состоит из комбинации высокоэффективных адсорбентов, минерального и органического происхождения, что очень эффективно против широкого спектра микотоксинов, способствует максимальному выведению их из организма, улучшению состояния ЖКТ и здоровья печени, повышению продуктивности животных и их сохранности.

Нормы ввода

	ИСПОЛНЕНИЕ А ВАШ БЕЛОК	ИСПОЛНЕНИЕ Б НАШ БЕЛОК
Ввод БВМКК	5 %	20 %
Суточная дача	75 г/гол	300 г/гол
Шрот подсолнечный или жмых рапсовый	15 %	—
Зерновая группа	80 %	80 %

Состав

Шрот подсолнечный · дрожжевая кормовая смесь · монокальцийфосфат кормовой · мел кормовой · соль пищевая · масло растительное · **адсорбентный комплекс · ферментно-пробиотический комплекс ·** дополнительный минеральный комплекс · ароматизатор · витамин А · витаминно-минеральный концентрат ПКР-2 (0,1 %)

Показатели качества · на 1 кг концентрата

	СЫРОЙ ПРОТЕИН, %	СЫРОЙ ЖИР, %	КЛЕТЧАТКА, %	КАЛЬЦИЙ, %	ФОСФОР, %	СОЛЬ, %	К. ЕД. / 100 КГ	ОЭ, МДЖ/КГ
Исполнение А · 5 %	12,57	1,45	0,35	13,84	5,70	14,28	31	3,8
Исполнение Б · 20 %	32,51	2,31	9,85	3,87	2,12	4,01	75	8,8

ЭТАП 1
Телёнок
БВМКК-1-к · 10–75 дней

ЭТАП 2
Доразщивание
БВМКК-2-к · 76–115 дней
ЭТОТ ПРОДУКТ

ЭТАП 3
Лактация
БВМКК-61-1С-к · около 305 дней

ЭТАП 4
Сухостой
БВМКК-61-1С-к · около 60 дней

БВМКК-61-1С-к · лактация

высокопродуктивные коровы

Аминокислотный комплекс сбалансирован таким образом, что весь поступающий с кормом сырой протеин полностью участвует в синтезе белка, что предотвращает не только негативное воздействие на печень, но и приводит к **увеличению надоев молока на 10–15 % без ухудшения его качества.**

Дополнительный минеральный комплекс плюс повышенное содержание витамина Е

Положительно влияет на поедаемость кормов, укрепление иммунитета животных, способствует укреплению копытного рога, увеличению надоев, увеличению содержания белка в молоке; а также приводит к снижению концентрации соматических клеток в молоке и увеличению жирности молока. Отдельные компоненты способствуют снижению межтелого периода и увеличению продуктивного долголетия коров.

Оптимальный баланс фосфор / кальций / магний

Способствует увеличению продуктивности и поддержанию отличного состояния лактирующих коров.

Живая дрожжевая культура и ферментно-пробиотический комплекс

Стимулируют развитие полезных рубцовых бактерий, что влияет на увеличение в рубце ферментов, расщепляющих клетчатку и крахмал до простых сахаров, повышая при этом энергетическую ценность кормов. Стабилизируется pH рубца, что предотвращает развитие ацидоза и кетоза. Корма быстрее перевариваются и лучше усваиваются, что улучшает конверсию корма, а соответственно растёт молочная продуктивность животного.

Комплекс адсорбентов микотоксинов

Состоит из комбинации высокоэффективных адсорбентов, минерального и органического происхождения, что очень эффективно против широкого спектра микотоксинов, способствует максимальному выведению их из организма, улучшению состояния ЖКТ и здоровья печени, повышению продуктивности животных и их сохранности.

Нормы ввода

	ИСПОЛНЕНИЕ А ВАШ БЕЛОК	ИСПОЛНЕНИЕ Б НАШ БЕЛОК
Ввод БВМКК	5 %	20 %
Суточная дача	300–400 г/гол	1200 г/гол
Шрот подсолнечный или жмых рапсовый	20 %	—
Зерновая группа	75 %	80 %

Состав

Шрот подсолнечный · дрожжевая кормовая смесь · монокальцийфосфат · соль пищевая · мел кормовой · масло растительное · дополнительный минеральный комплекс · комплекс адсорбентов микотоксинов · ферментно-пробиотический комплекс · витаминно-минеральный комплекс П60-3

Показатели качества · на 1 кг концентрата

	СЫРОЙ ПРОТЕИН, %	СЫРОЙ ЖИР, %	КЛЕТЧ., %	ЛИЗИН, %	МЕТ. + ЦИСТИН, %	ТРИПТ., %	КАЛЬЦИЙ, %	ФОСФОР, %	СОЛЬ, %	К. ЕД. / 100 КГ	ОЭ, МДЖ/КГ
Исполнение А · 5 %	19,25	0,81	4,25	1,08	0,57	0,24	7,26	2,80	9,58	44	5,1
Исполнение Б · 20 %	25,89	1,21	6,97	1,38	0,73	0,23	5,48	2,96	7,28	60	7,1

ЭТАП 1

Телёнок

БВМКК-1-к · 10–75 дней

ЭТАП 2

Доразщивание

БВМКК-2-к · 76–115 дней

ЭТАП 3

Лактация

БВМКК-61-1С-к · около 305 дней

ЭТОТ ПРОДУКТ

ЭТАП 4

Сухостой

БВМКК-61-1С-к · около 60 дней

БВМКК-61-1С-к · сухостой

сухостойный период · ввод 5 %

Основной задачей в кормлении сухостойных коров является недопущение критических сбоев в организме при отёле и переходе к периоду лактации. С этой задачей прекрасно справляется наш концентрат.

Дополнительный минеральный комплекс + повышенное содержание витамина Е

Положительно влияет на укрепление иммунитета животных, существенно уменьшается число послеродовых осложнений (кетозы, ацидозы, задержка плаценты), а также способствует рождению здоровых и крепких телят.

Оптимальный баланс фосфор / кальций / магний

Составлен таким образом, чтобы после отёла избежать резкой потери уровня кальция в крови (гипокальциемии) в связи с большими потерями этого элемента с молоком и низкой мобилизацией из костей, что в дальнейшем позволяет избежать таких проблем, как родильный парез, смещение (дисплазия) сычуга, задержка последа.

Ферментно-пробиотический комплекс

Стабилизирует pH рубца, предотвращая его закисление, что служит профилактикой ацидоза и кетоза; подготавливает микрофлору ЖКТ и поддерживает ворсинки рубца в здоровом состоянии для дальнейшего перехода на высокое содержание концентрированных кормов в период раздоя.

Комплекс адсорбентов микотоксинов

Комбинация высокоэффективных адсорбентов минерального и органического происхождения, эффективная против широкого спектра микотоксинов; способствует улучшению состояния ЖКТ и здоровья печени, а также *положительно влияет на развитие плода в период стельности коров.*

Нормы ввода

Ввод БВМКК	5 %
Суточная дача	150 г/гол
Шрот подсолнечный или жмых рапсовый	10 %
Зерновая группа	85 %

Состав

Шрот подсолнечный · монокальцийфосфат · соль пищевая · мел кормовой · масло растительное · **дополнительный минеральный комплекс** · **витамин Е** · **комплекс адсорбентов микотоксинов** · **ферментно-пробиотический комплекс** · витаминно-минеральный комплекс П60-3

Показатели качества · на 1 кг концентрата

	СЫРОЙ ПРОТЕИН, %	СЫРОЙ ЖИР, %	КЛЕТЧ., %	ЛИЗИН, %	МЕТ. + ЦИСТИН, %	ТРИПТ., %	КАЛЬЦИЙ, %	ФОСФОР, %	СОЛЬ, %	К. ЕД. / 100 КГ	ОЭ, МДЖ/КГ
Сухостой · ввод 5 %	22,00	1,98	11,0	0,74	0,89	0,26	5,63	2,69	9,57	—	6,0

ЭТАП 1

Телёнок

БВМКК-1-к · 10–75 дней

ЭТАП 2

Доразщивание

БВМКК-2-к · 76–115 дней

ЭТАП 3

Лактация

БВМКК-61-1С-к · около 305 дней

ЭТАП 4

Сухостой

БВМКК-61-1С-к · около 60 дней

ЭТОТ ПРОДУКТ

Что даёт программа

оба периода



Высокое выбытие коров из основного дойного стада — в том числе **непроизвольное выбытие новотельных коров** — остаётся системной проблемой. Одно из первых мест среди её причин занимает несоответствие технологий кормления. В основе — снижение иммунного статуса и нарушение метаболизма, которые происходят из-за несоответствия поступающих питательных веществ реальным потребностям высокопродуктивного животного.

1 Баланс рациона

Позволяют сбалансировать рацион по витаминам, микро- и макроэлементам.

2 Пик лактации

Продляют пик лактации, повышается удой, повышается качество молока — белок, жир, низкая концентрация соматических клеток в молоке.

3 Обмен веществ

Предотвращают нарушение обмена веществ, развитие ацидоза и кетоза.

4 Расход корма

Повышают усвоение питательных веществ, что ведёт к снижению расхода корма.

5 Иммуитет

Укрепляют иммунитет коровы.

6 Мастит

Обеспечивают профилактику мастита.

7 Копыта

Снижают количество заболеваний копыт.

8 Молодняк

Способствуют рождению здорового и крепкого молодняка.

Нетели и коровы с хорошо развитым рубцом используют питательные вещества корма значительно эффективнее — это напрямую отражается на надоях. **Полноценное и сбалансированное кормление молодняка является основой успешного выращивания ремонтных тёлочек.**



Считаем рацион под ваше хозяйство

ЗАО «Агростандарт»

220114, г. Минск, ул. Филимонова, 49, офис 6
УНП 190917649
р/с BY10BELB30120068140010226000
в РКЦ «ЛУЧ» ОАО «Банк БелВЭБ»,
г. Минск, пр. Независимости, 95, BIC BELBKY2X

Отдел продаж

+375 44 730-52-42

тел/факс (017) 352-36-80, 352-36-70
minsk@agrostandart.by
www.agrostandart.by

